M. n.° 5

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation Sur Lamputation des amigdales

Lamputation des amigdales Schirreuses est une de celles que dionis rejette, mais Monsieur le cat.* nous rassure et nous donne d'apres l'expérience le parallele des differentes methodes qu'on peut employer pour executer avantageusement cette operation, il conclut que L'instrument tranchant est a preferer a tout autre, parceque L'hemorragie eu egard a la composition des parties qu'on doit retrancher n'est pas a craindre et que d'ailleurs les Stiptiques doivent toujours l'arreter si cet accident arrive, il dit aussi qu'on doit prendre patience et y exhorter d'avance le Malade parceque les operations pratiquées dans le gosier sont longues par les nausées frequentes et la Necessité de gargariser a chaque instant.

j'ai vu plusieurs Sujets a qui on a fait cette operation, ils m'ont assuré qu'elle avoit été tres longue et laborieuse. c'est ce qui m'a donné lieu d'imaginer que si on pouvoit arreter Solidement ces tumeurs, on pourroit executer l'operation en peu de temps et sans beaucoup faire

* observ. de Medecine, Chirurg. et pharmacie fevrier 1766.

souffrit le Malade

Ces reflexions m'ont determiné a approprier et faire construire un instrument qui a environ six pouces de longueur, ce sont deux errhines doubles Montées et configurées comme des ciseaux combes, ses branches ont trois pouces quatre lignes Compris les anneaux. il y a deux pouces cinq lignes depuis le clou jusqu'aux extremitées des errhines, dont les quatre pointes sont tournées les unes de droite a gauche et les deux autres de gauche a droite; elles se croisent environ d'une ligne

Lorsque je me suis servi de cet instrument, il a superieurement rempli mes vües; j'ai fait entrer ces quatre pointes dans l'epaisseur de la glande en poussant L'instrument entre les piliers sa convexité étant tournée du coté du pilier posterieur. j'ai ensuite placé les branches dans la commissure des levres du coté opposé a la Maladie et je les ai confié a un aide que j'avois instruit

j'avois aussi preparé des ciseaux bien tranchans dont les pointes sont emoussées, qui ont à peu pres

de six pouces de longueur et dont les lames
sont de quelques lignes plus ~~Larges~~ Longues que les branches
j'ai porté L'index de la main gauche pour detourner
le pillier anterieur et avec les ciseaux j'ai coupé
la glande d'entre les pointes de l'instrument

j'ai eû l'avantage d'emporter la tumeur sans
laisser aucun Lambeau ; deux ou trois coups de
ciseaux ont suffi pour chaque operation et
l'amputation des deux amigdales n'a pas duré
deux Minutes

Lamigdale du coté gauche est moins facile
a couper que celle du coté droit. le pilier anterieur
n'est pas aisé a eloigner. on ne peut le faire
qu'en elevant le poignet et en portant le doigt
du haut en bas ; le coté droit aucontraire ne
presente pas la Moindre difficulté ; le poignet
placé dans un sens contraire permet a l'index
d'eloigner le pilier anterieur et l'operateur
peut emporter la glande en un instant

La Malade agée de vingt deux ans n'a eû
aucun accident, l'eau froide a arreté le peu
de sang qui a paru. elle a fait usage pendant
les premiers vingt quatre heures d'un gargarisme

fait avec l'eau de racine de guimauve
et le lait, le vin miellé aidé d'un regime
humectant a terminé la cure en cinq ou
six jours —

Monsieur Lieutenant de Monsieur le premier
chirurgien du Roy et chirurgien en chef de l'hotel
Dieu de Reims

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE